

**Pre-Loss Demographic and Psychological Predictors of Complicated Grief among Relatives of Terminally Ill Cancer Patients**

**Luigi Lombardo**<sup>a</sup>, Emanuela Morelli<sup>a</sup>, Massimiliano Luciani<sup>b</sup>, Fernando Bellizzi<sup>a</sup>, Paola Aceto<sup>c</sup>, Italo Penco<sup>a</sup>, Carlo Lai<sup>d</sup>

a 'Fondazione Roma' Hospice-SLA-Alzheimer, Roma, Italy (oggi Fondazione Sanità e Ricerca)

b Institute of Psychiatry and Psychology, Catholic University of Sacred Heart, Rome, Italy

c Institute of Anaesthesiology and Intensive Care, Catholic University of Sacred Heart, Rome, Italy

d Department of Dynamic and Clinical Psychology, University of Rome 'Sapienza', Rome, Italy

Psychother Psychosom 2012;81:256–258 DOI: 10.1159/000336428

Abstract not available

**UN SONDAGGIO DI OPINIONE TRA I CAREGIVERS DI PAZIENTI ONCOLOGICI IN FASE TERMINALE DI MALATTIA**

**Luigi Lombardo**<sup>\*</sup>, Emanuela Morelli<sup>\*</sup>, Massimiliano Luciani<sup>\*\*</sup>, Italo Penco<sup>\*</sup>, Carlo Lai<sup>\*\*\*</sup>

<sup>\*</sup> 'Fondazione Roma' Hospice-SLA-Alzheimer, Roma. (oggi Fondazione Sanità e Ricerca)

<sup>\*\*</sup> Istituto di Psichiatria e Psicologia, Università Cattolica del Sacro Cuore, Roma.

<sup>\*\*\*</sup> Dipartimento di Psicologia Dinamica e Clinica, Università di Roma "Sapienza", Roma.

Bioetica 4/2012; Anno XX n. 4, dicembre 2012

**Abstract**

Le problematiche di fine vita sono divenute materia di dibattito etico e politico in molti Paesi. Un aumento dell'accettazione dell'eutanasia tra la popolazione generale, ha avuto luogo, nelle ultime due decadi, in quasi tutti i Paesi dell'Europa occidentale. L'obiettivo di questo studio è quello di esplorare l'atteggiamento nei confronti dell'eutanasia e di altre problematiche di fine vita in un campione di caregivers di pazienti in fase terminale di malattia assistiti in hospice. È stato somministrato un questionario contenente ventiquattro domande riguardanti eutanasia, accanimento terapeutico, suicidio assistito, testamento biologico, al quale hanno risposto in modo anonimo 225 caregivers. I risultati hanno messo in evidenza un quadro complesso. L'accettazione dell'eutanasia tende a essere alta (58%) secondo quello che è il trend mostrato in alcune indagini condotte in Italia e in Europa tra la popolazione generale, mentre è stata evidenziata un'accettazione dell'accanimento terapeutico più bassa. È stato riscontrato un basso livello di informazione riguardo il suicidio assistito e il testamento biologico.